

# **CARCINOMA PULMONAR ASSOCIADO À SÍNDROME DA VEIA CAVA SUPERIOR: UM RELATO DE CASO**

## **INTRODUÇÃO**

A Síndrome da Veia Cava Superior (SVCS) compreende um conjunto de sinais e sintomas decorrentes da obstrução ao fluxo sanguíneo da veia cava superior (VCS). A clínica varia de acordo com a localização, gravidade e rapidez que o processo se instala.

## **OBJETIVOS**

Relatar um caso de carcinoma pulmonar cursando com SVCS para contribuir no reconhecimento da patologia e suas condições associadas.

## **DELINEAMENTO E MÉTODOS**

Relato de caso.

## **RESULTADOS**

Masculino, 60 anos, histórico de doença pulmonar obstrutiva crônica e alta carga tabágica. Encaminhado ao hospital por insuficiência respiratória aguda, sendo necessário intubação orotraqueal, ventilação mecânica e uso de droga vasoativa para compensação do quadro inicial. Realizada tomografia computadorizada na admissão que indicou extensa massa pulmonar e pulmão enfisematoso. No mesmo dia, necessitou de unidade de terapia intensiva, evoluindo ao longo da internação com episódios de despertar agitado e combativo à tentativa de desmame de sedoanalgesia, sendo indicada traqueostomia precoce. Cerca de oito dias após sua admissão apresentou pletora facial importante. Solicitada angiotomografia de tórax, a qual confirmou compressão da VCS por massa pulmonar. Realizada biópsia da lesão, resultando em carcinoma de não pequenas células. Após estabilização do quadro, recebeu alta hospitalar para cuidado e seguimento ambulatorial da patologia de base em setor oncológico específico.

## **CONCLUSÃO**

A SVCS, em sua maioria, apresenta-se durante a evolução de neoplasias malignas intratorácicas que comprimem ou invadem o vaso. A dispneia é o sintoma mais comum, ao exame físico comumente encontra-se edema facial e distensão venosa cervical. O diagnóstico é clínico e radiológico, e 60% dos pacientes descobrem neoplasia maligna em decorrência da SVCS. Dessa forma, é essencial ao estabelecimento dessa síndrome elencar suas possíveis etiologias, tendo em vista que é clínica comumente relacionada à pacientes com doença de elevada morbimortalidade.

**Palavras chave: síndrome da veia cava superior, pletora facial, neoplasia**

## Referências

(1)CORDEIRO, Samuel Zuínglio de Biasi; CORDEIRO, Paulo de Biasi. Síndrome da veia cava superior. **Jornal de Pneumologia** , v. 28, p. 288-293, 2002.

(2)BRAGA, Sandrina Figueiredo e cols. Síndrome da veia cava superior: caso clínico. **Angiologia e Cirurgia Vascolar** , v. 10, n. 1, pág. 12-15, 2014.

(3)MATSUMOTO, DALVA YUKIE. Síndrome da veia cava superior. **Manual de Cuidados Paliativos** , p. 181, 2008.

(4)SAADI, Rodrigo Petersen e cols. Síndrome da veia cava superior. **Acta méd.(Porto Alegre)** , p. 436-444, 2018.

Lorrayne de Aquino Solles; Lívia Angélica Gruneke Cesar; Gabriela Prestes da Silva; Giovanna Bertotti;

UNIVALI, Itajaí-SC

E-mail para contato: [lorrayne.solles@outlook.com](mailto:lorrayne.solles@outlook.com)